

# Voltaren 24H Parche



## INSERTO PARA EL PACIENTE

Voltaren 24 H  
Diclofenaco sódico 1%  
Parche transdérmico

Los parches de Voltaren 24 H, vienen en dos tamaños 7X10 cm adecuado a tus necesidades y 14 X10 cm para mayor cobertura de la zona afectada.

Lea detenidamente este inserto antes de utilizar Voltaren 24 H Parche transdérmico. Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda.

### 1. ¿Qué contiene Voltaren 24 H?

Cada parche de Voltaren 24 H contiene diclofenaco sódico al 1%

El parche transdérmico también contiene los siguientes componentes inactivos: Levomentol, N-metil-2-pirrolidona, ésteres de propilenglicol de ácidos grasos, ácido cítrico anhidro, copolímero en bloque del estireno-isopreno-estireno, polisobutileno, goma éster, 2-mercaptopbencimidazol, dibutilhidroxitolueno, parafina líquida.

## PROPIEDADES/ INDICACIONES

### 2. ¿Para qué sirve Voltaren 24 H?

Voltaren 24 H ayuda a aliviar el dolor, inflamación e hinchazón en lesiones de tejido blando: trauma de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones debido a torceduras, esguinces, moretones y dolores de espalda. Formas localizadas de reumatismo en tejidos blandos como tendinitis (ej. codo de tenista), bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía. Auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis de la rodilla o dedos.

## DOSIS/ MODO DE EMPLEO

### 3. ¿Cómo debe ser usado Voltaren 24 H?

Solo para uso en la piel.  
No se use en niños menores de 15 años de edad.  
Aplique un parche de Voltaren 24 H por día en el área con dolor.  
Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico.  
No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.  
Método de Aplicación: Antes del primer uso, el sobre sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El parche debe aplicarse inmediatamente después de haber retirado la película plástica.  
Si la condición no mejora dentro de 7 días o empeora, informe a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

### 4. ¿Cuándo no debe usarse Voltaren 24 H?

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si es hipersensible al diclofenaco o a cualquiera de los excipientes contenidos enumerados en la sección "¿Qué contiene Voltaren® 24 H?".

Si ha tenido alguna vez una reacción alérgica o ataque asmático después de utilizar diclofenaco o cualquier otro antiinflamatorio/analgésico como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno.

### 5. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Voltaren 24 H?

No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una erupción en la piel después de aplicar el producto.

No use más producto del indicado o durante un periodo de tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique su médico.

No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos después de usarlo. Tenga cuidado de que este medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico o farmacéutico si persisten las molestias.

Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente utilizada para lesiones como esguinces puede utilizarse, pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos. Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno que pueden causar irritación leve localizada en la piel en algunas personas.

## EMBARAZO/ LACTANCIA

### 6. ¿Puede ser utilizado Voltaren 24 H durante el embarazo o el periodo de lactancia?

Si usted está embarazada, en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de embarazarse, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

No use si está en los últimos 3 meses del embarazo, ya que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas en el parto. (Logosímbolo Mujer Embarazada).

## USO PEDIÁTRICO/ NIÑOS

### 7. ¿Puede ser usado Voltaren 24 H en los niños?

No se use en niños menores de 15 años de edad  
PERSONAS DE EDAD AVANZADA

### 8. ¿Puede ser usado Voltaren 24 H en las personas de edad avanzada?

Voltaren 24 H puede ser utilizado en pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años). Se puede utilizar la dosis usual para adultos.

## REACCIONES SECUNDARIAS

### 9. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Voltaren 24 H?

Cuando utilice este producto usted puede experimentar: Erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria; sibilancia (hacer silbidos al respirar), dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación del rostro, labios, lengua o garganta; comezón o enrojecimiento de la piel.

La piel podría ser más sensible a la luz del sol (cabina solar o de bronceado). Algunos posibles signos son quemaduras de sol con comezón, inflamación y ampollas.

## INTERACCIONES

### 10. ¿Está tomando otros medicamentos?

Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento regular de prescripción o de venta libre.

Si usted ingiere este medicamento: Busque atención médica inmediata.

## COMENTARIOS ESPECIALES

### 11. ¿Cómo debe almacenar Voltaren 24 H?

- Consérvese a no más de 25°C.
- Almacene los parches en el empaque original, para protegerlos de la luz y humedad.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en el empaque.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Hecho en Japón por:  
Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd., Fukushima Plant  
8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-Machi, Fukushima-Shi, Fukushima 960-0101  
Japón

Para:  
Novartis Consumer Health Inc.,  
200 Kimball Drive, Parsippany, NJ 07054-0622  
New Jersey, EUA.

Acondicionado por:  
Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd., Fukushima Plant  
8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-machi, Fukushima-shi, Fukushima 960-0101, Japón

Acondicionador secundario alterno:  
DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.  
Autopista México Querétaro Km. 34.5 Nave 6 Int. 5,  
Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México,  
México.

Representante Legal, distribuidor e importador:  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.  
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos,  
México.

Reg. No. 031M2006 SSA VI  
® Marca Registrada

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 01 800 234 3000 o en [valoramos.tu-opinion@gsk.com](http://valoramos.tu-opinion@gsk.com)  
Reporte las sospechas de reacción adversa a los correos: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) y [farmacovigilancia.mx@gsk.com](mailto:farmacovigilancia.mx@gsk.com)



01800 234 3000

[valoramos.tu-opinion@gsk.com](mailto:valoramos.tu-opinion@gsk.com)

